



МЧУ «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «РАМБАМ»

127055, гор. Москва, ул. Образцова, д. 11, стр. 2, стр. 5

Тел.: +7(495) 663 23 55

e-mail: info@rimc-rambam.ru

www.rimc-rambam.ru

Лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ ЛО-77-01-012493 от 14 июня 2016 г.

Информированное добровольное согласие

на проведение раздельного диагностического выскабливания цервикального канала

г. Москва

« ____ » _____ 20 __ г.

Я, _____,

(Ф.И.О. пациента)

Этот раздел бланка заполняется только в том случае, если от имени и в интересах пациента действует его представитель

Я, _____,

(Ф.И.О. представителя пациента)

выступаю от имени и в интересах представляемого мною Пациента _____

(Ф.И.О. пациента)

настоящим подтверждаю, что, проинформирована врачом о состоянии моего здоровья и предварительном диагнозе _____.

В связи с этим мне рекомендовано выскабливание цервикального канала шейки матки.

Врачом в доступной для меня форме мне разъяснены:

- **цели оказания медицинской помощи:** диагностическая манипуляция по удалению поверхностного слоя слизистой оболочки шейки матки для изучения её строения под микроскопом.

Полученные образцы тканей отправляют в лабораторию, где их проверяют на наличие раковых и предраковых клеток. Показаниями для выскабливания цервикального канала являются:

- **Подозрение на патологии эндоцервикса.** Во время выскабливания берутся образцы слизистой шейки матки для исключения рака шейки матки, дисплазии и других патологических процессов.
- **Патологии шейки.** Взятие тканей проводят, чтобы определить, не перешёл ли патологический процесс с шейечной области на цервикальный канал. Кюретаж позволяет определиться с планируемым объемом лечения

Мне разъяснено, что процедура может сочетаться с другими оперативными методами:

- Лечением эрозии (эктопии) шейки – в этом случае анализ взятых тканей позволяет оценить распространение заболевания внутрь шейки матки.
- Ножевой и радиоволновой биопсией – получением образцов тканей при помощи хирургического инструмента и радионожка с целью исследования на опухоли. Сочетание биопсии с выскабливанием дает возможность найти очаги злокачественного перерождения не только на шейечной слизистой, но и в цервикальном канале.

Мне разъяснено, что выскабливание цервикального канала шейки матки проводится в амбулаторных условиях: шейка матки фиксируется специальными щипцами, чтобы исключить вероятность ранения подвижного органа. Также цервикальный канал расширяют специальными инструментами для создания необходимого пространства для выполнения манипуляции, потому что его анатомический диаметр менее 4 мм. Слизистая цервикального канала, только поверхностный слой, выскабливается острой ложечкой — кюреткой, материал собирается в пробирку для

последующего исследования. В дальнейшем нужно будет несколько раз прийти на прием к врачу, чтобы гинеколог проконтролировал процесс заживления тканей.

Мне разъяснено, что процедура проводится под местной анестезией.

- **связанный с методами риск:** В норме выскабливание не вызывает неприятных последствий для организма, в течение нескольких дней возможны небольшие кровянистые выделения. Не исключается воспаление раневой поверхности — это наиболее частое осложнение, проявляющееся мажущими неприятно пахнущими выделениями, в тяжелых случаях — температурой. Очень редко, но с рыхлой шейки матки могут соскочить подтягивающие и фиксирующие щипцы, что приведет к разрывам шейки. В большинстве случаев они самостоятельно заживают, при большом надрыве требуется зашивание. В дальнейшем может сформироваться деформирующий шейку рубец.

- **предполагаемые результаты оказания медицинской помощи:** Мне разъяснено, что своевременное и качественное проведение выскабливания цервикального канала шейки матки позволяет установить диагноз и назначить адекватное лечение.

Возможные осложнения: обычно в течение 6-7 дней место выскабливания внутри шейки матки кровит, поэтому в этот период нужно использовать гигиенические прокладки. Тампонами пользоваться нельзя. До разрешения врача запрещается:

- Париться в бане, сауне, принимать ванны.
- Купаться в водоемах.
- Жить половой жизнью.
- Спринцеваться.
- Подвергать организм тяжелым физическим нагрузкам, поднимать тяжести, заниматься на тренажерах.

При возникновении спазма после выскабливания, сопровождающегося нарушением отхождения крови из маточной полости, нужно выпить спазмолитик. При отсутствии эффекта следует обратиться к врачу, который снимет спазм, уберёт скопившуюся кровь и сгустки с помощью специального инструмента.

Мне разъяснено, что при проявлении осложнений после проведения процедур необходимо обратиться в клинику Медицинское частное учреждение «Медицинский центр «Рамбам» для дополнительного обследования и консультации с врачами-специалистами в целях исключения описанных выше осложнений.

Я поставила в известность врача обо всех моих проблемах со здоровьем, хронических заболеваниях, инфицированностью различными возбудителями, в том числе ВИЧ, гепатит, случаях индивидуальной непереносимости лекарств.

Также я предупреждена о необходимости точного и тщательного выполнения рекомендаций врача после проведенного медицинского вмешательства.

Я имела возможность задать врачу все интересующие меня вопросы и получила на них удовлетворяющие меня ответы, и на основании вышеизложенного я добровольно и осознанно принимаю решение о проведении мне (представляемому) данного медицинского вмешательства врачом Медицинского частного учреждения «Медицинский центр «Рамбам».

Беседу провел врач _____ (подпись, Ф.И.О.)

Пациент (представитель пациента) согласился с проведением медицинского вмешательства
_____ (подпись)

Пациент (представитель пациента) отказался от проведения медицинского вмешательства
_____ (подпись)